

В продолжение дачного сезона.

Добрый день всем дачникам!!!

Открывается новый сезон и как всегда много дел на даче после затяжной зимы. В этой статье хотелось бы поговорить о столь надоевшей всем проблеме бабочке



Листовертке, которая приносит огромный урон всем плодоносящим деревьям и кустарникам. Вред наносят в основном личинки «червеобразные гусеницы» из разряда чешуйчатые, которые появляются ранней весной перезимовавшие в почве и выдерживающие до -40 градусов.

Предпочитают личинки в основном бутоны, первые почки деревьев, плоды ягод и первые листья зеленых насаждений. В России насчитывается около 2500 видов разных ярких видов бабочек листоверток, которые нам так всем нравятся, но приносят вред садовым и парковым насаждениям. Жизненный цикл их не большой, на это влияет температура, влажность, и другие



факторы. В течение всего времени самка откладывает на ветках и листьях от нескольких десятков до 150 яиц, период вы плода две недели. Мы можем видеть красивых и пестрых бабочек ранним утром и на закате солнца, и не задумываться



какой вред они несут садовому и парковому хозяйству, вот по, чему нужно регулировать численность этих насекомых обрабатывая ранней весной и до начала цветения и сразу после окончания цветения. различными препаратами. Можно обрабатывать в садах как биологические средствами «Лепидоцид» и «Бикостелин» так и химическим «Корбафос КЭ»,

«Конфидор» «Фуфанон». Нашими специалистами «Дез Профи 161» Ростов-на-Дону были обработаны многочисленные насаждения



и произведен контроль за численностью вредителей зеленых насаждений, этими препаратами приведшие к снижению насекомых. Мы стоим на страже садово-парковых культур, что бы вы наслаждались красотой природы.